СПИСОК ОБСЛЕДОВАНИЙ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ГИБП

Справочно-информационный материал для медицинских и фармацевтических работников

ЭФЛЕЙРА®
нетакимаб

ОБСЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕД НАЗНАЧЕНИЕМ ГИБП[1]

ОБСЛЕДОВАНИЕ ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ЛАТЕНТНОГО (И АКТИВНОГО) ТУБЕРКУЛЕЗНОГО ПРОЦЕССА:

- постановка реакции Манту;
- проведение Диаскинтеста, или теста QuantiFERON-TB Gold, или теста T-spot.TB;
- проведение рентгенографии органов грудной клетки в 2 проекциях и/или спиральной компьютерной томографии органов грудной клетки.

При подозрении на наличие активной и латентной туберкулезной инфекции заключение фтизиатра о возможности проведения терапии генно-инженерными биологическими препаратами.

АНАЛИЗ КРОВИ

Биохимический анализ крови должен включать, но не ограничиваться:

- общий белок, белковые фракции;
- концентрацию мочевины;
- креатинин;
- билирубин;
- трансаминазы;
- щелочную фосфатазу.

Клинический анализ крови должен включать, но не ограничиваться:

- количество эритроцитов;
- гемоглобин;
- количество тромбоцитов;
- количество лейкоцитов;
- лейкоцитарную формулу;
- СОЭ.

Анализ крови на:

- HbsAg (гепатит B);
- anti-HCV (гепатит C);
- сифилис;
- ВИЧ-инфекцию.

ОБЩИЙ АНАЛИЗ МОЧИ

ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ (ЕСЛИ ПРИМЕНИМО)

Rp.: solutio netakimabi 60 mg - 1 ml
D.S.

РЕЖИМ ВВЕДЕНИЯ ПРЕПАРАТА НЕТАКИМАБ[2]



ВАЖНО: на фоне приема ГИБП обследование рекомендуется повторять каждые 6 месяцев

[1] Генно-инженерные биологические препараты

[2] Согласно инструкции по медицинскому применению лекарственного препарата Эфлейра, www.grls.rosminzdrav.ru

АДАПТИРОВАНО ИЗ:

1.Клинические рекомендации Российского общества дерматовенерологов и косметологов, 2016

2.В. И. Мазуров, М. М. Хобейш, Е. А. Трофимов, Принципы лечения псориаза и псориатического артрита, Методическое пособие, Санкт-Петербург, 2017

3.Клинические рекомендации Ассоциации ревматологов России, 2016

BIOCAD
Biotechnology Company

RU.EFL.00001.