



Рекомендации по профилактике  
и контролю гриппоподобного синдрома



Для перехода на общую характеристику  
лекарственного препарата ТЕНЕКСИА®  
отсканируйте QR-код:



Литература:

1. Листок-вкладыш лекарственного препарата ТЕНЕКСИА®.
2. Общая характеристика лекарственного препарата ТЕНЕКСИА®.

Справочно-информационный материал. Информация предназначена  
исключительно для специалистов здравоохранения: медицинских  
и фармацевтических работников.

**BICCAD**  
Biotechnology Company

На фоне терапии интерферонами бета может развиться гриппоподобный синдром

- Заболевание, похожее на грипп, чаще может развиваться **в начале лечения** препаратами интерферона бета (в том числе на фоне лечения ТЕНЕКСИА®)
- Частота и выраженность гриппоподобного синдрома **снижается со временем**
- При соблюдении определенных рекомендаций возможно **предотвратить появление** гриппоподобного синдрома или **снизить его частоту и выраженность**

## Постепенное увеличение дозы ТЕНЕКСИА®

Постепенное увеличение дозы ТЕНЕКСИА® в начале лечения **способствует лучшей переносимости** гриппоподобного заболевания, сопровождающего начало применения интерферонов

С подробной информацией о введении препарата ТЕНЕКСИА® можно ознакомиться в листке-вкладыше и общей характеристике лекарственного препарата



## Рекомендации по профилактике появления и контролю гриппоподобного синдрома:



### Изменение времени инъекции

Гриппоподобное заболевание развивается в разное время у каждого пациента. В среднем оно возникает примерно через 10 часов после инъекции ТЕНЕКСИА® и длится от 12 до 24 часов



### Прием нестероидного противовоспалительного препарата

Например, парацетамол или ибuproфен, за полчаса до инъекции препарата ТЕНЕКСИА® и в случае развития гриппоподобного заболевания. Прием нестероидного противовоспалительного препарата\*



### Питье большого количества воды

Если наблюдается жар, чтобы поддерживать гидратацию

## Инициация терапии

день 0



1-я инъекция:

60 мкг

день 14



2-я инъекция:

120 мкг

## Продолжение терапии

день 28

(и каждые 2 недели после)



Инъекция полной дозы:

240 мкг

Для перехода на видеоИнструкцию с техникой выполнения инъекции препарата ТЕНЕКСИА® отсканируйте QR-код:

